


건강한 모기르기와 올바른 병해방제 요령 !

▶ 못자리 발생 병해방제 방법

균사가 보이면서 모가 마르고 썩는 증상이 보임



흰색



입고병
(Rhizoctonia,
Rhizopus)

• 방제 방법

- 다코닐 수화제 500~1,000배액 상자당 500ml 관주, 칼라링 500배액 살포
- 약제 살포시 배수를 철저히 한 후 살포, 살포 후 최소 24시간 이후 물대기

다찌까렌 약제는
Rhizopus 균은
효과가 없음.
주의 요망



▶ 못자리 발생 병해방제 방법

균사가 보이면서 모가 마르고 썩는 증상이 보임



• 방제 방법

- 다찌밀 액제(다찌에이스) 500배액 상자당 500ml 관주, 칼라링 500배액 살포
- 다코닐 액제와 혼용할 경우 약해 발생, 근접살포 및 혼용 금함
- 약제 살포시 배수를 철저히 한 후 살포 후 최소 24시간 이후 물대기
- 온도관리 주간 30℃ 이상, 야간 10℃ 이하 떨어지지 않게 관리
- 토양산도 pH 5.0 유지 중요

▶ 못자리 발생 병해방제 방법

균사가 보이면서 모가 마르고 썩는 증상이 보임



회녹색(청색)



입고병
(Trichoderma)

• 방제 방법

- 베노밀 수화제 500~1,000배액 상자당 500ml 처리
- 토양 및 공기 전염성 병해로 발병 후에는 효과가 거의 없음



▶ 못자리 발생 병해방제 방법

균사가 보이지 않고 모가 마르고 썩는 증상이 보임



입고병
(Pythium)

• 방제 방법

- 다찌밀 액제(다찌에이스) 500배액 상자당 500ml 관주, 칼라링 500배액 살포
- 다코닐 액제와 혼용할 경우 약해 발생, 근접살포 및 혼용 금함
- 약제 살포시 배수를 철저히 한 후 살포 후 최소 24시간 이후 물대기
- 온도관리 주간 30℃ 이상, 야간 10℃ 이하 떨어지지 않게 관리
- 토양산도 pH 5.0 유지 중요

