

2016-2017절기

어르신 인플루엔자 예방접종 안내문

예방접종 전 · 후 주의사항

- 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물면서 급성 이상반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다.
- 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- 접종당일 음주나 지나친 운동은 금하고, 반나절 이상 안정을 취합니다.

예방접종 후 이상반응 대처요령

| 예방접종 후 발생 가능한 이상반응 |

- 국소 이상반응 : 접종부위가 빨갱게 부어오름, 부종, 통증 등
- 전신 이상반응 : 발열, 근육통, 두통 등



| 예방접종 후 이상반응이 생기면 |

- 예방접종 부위의 통증, 빨갱게 부어오름, 부종, 근육통, 발열, 메스꺼움과 같은 경미한 이상반응은 접종 후에 일반적으로 나타날 수 있으며, 대부분 2~3일 이내 호전되므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.
- 다만, 증상이 심해지거나 장기간 지속되는 경우, 그 밖에 평소와 다른 심한 전신증상이 나타날 경우 즉시 의사의 진료를 받도록 합니다.



- 예방접종 후 이상반응이 발생하면 관할 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있습니다.
- 정부에서는 예방접종으로 인한 이상반응 발생 시 예방접종과의 관련성을 심의하여 진료비를 보상하는 「예방접종피해 국가보상제도」를 운영하고 있습니다.
- ※ 「예방접종피해 국가보상제도」 관련 세부사항은 관할 보건소로 문의하시기 바랍니다.

인플루엔자를 예방하는 건강한 생활습관

- 자주 손을 씻고 개인 위생수칙을 잘 지킵니다.
- 기침이나 재채기를 할 때는 손수건이나 휴지, 옷깃 등으로 입을 가리는 기침예절을 지킵니다.
- 인플루엔자가 유행할 때에는 가급적 사람들이 많이 모이는 장소의 방문을 피합니다.
- 인플루엔자 의심 증상이 있는 경우 진료를 받습니다.